

- EC FERTILIZER
- ÜRE ÜREAZ İNHİBİTÖRLÜ
[N-(n-butyl) Tiyofosforiktriamide İNHİBİTÖRLÜ (NBPT)]

Garanti Edilen İçerik	w/w
■ Üre Azotu (NH ₂ -N)	% 46
■ N-(n-butyl) tiyofosforiktriamide (NBPT)	% 0,06



KULLANIM ALANLARI VE DOZAJLARI		
Bitkiler	Uygulama Zamanı	Dozaj
Kesme Çiçekçilikte	Gelişim dönemi boyunca	15-20 kg / da 3 tekerrür
Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçlarında (yaşına göre)	Gelişim dönemi boyunca	15-20 kg / da 2 tekerrür veya 0,5-1 kg / ağaç
Tüm Sera Sebzelerinde	Gelişim dönemi boyunca	20-25 kg / da 3 tekerrür
Açık Alan Sebzeleri ve Yapraklı Yenen Kışlık Sebzelerde	Gelişim dönemi boyunca	15-20 kg / da 3 tekerrür
Tüm Endüstri Bitkilerinde	Gelişim dönemi boyunca	20-25 kg / da 2 tekerrür
Tüm Hububat ve Yeşil Alanlarda	Gelişim dönemi boyunca	20-30 kg / da 2 tekerrür
Kavun, Karpuz, Havuç, Turp, Çilek	Gelişim dönemi boyunca	20-25 kg / da 2 tekerrür
Üzüm, Bağ	Gelişim dönemi boyunca	15-20 kg / da 2 tekerrür veya 100-150 gr / omca
Patates	Gelişim dönemi boyunca	15-20 kg / da 2 tekerrür
Muz	Gelişim dönemi boyunca	15-20 kg / da 2 tekerrür veya 0,5-1 kg / ağaç
Fındık	Gelişim dönemi boyunca	15-20 kg / da 2 tekerrür veya 0,5-1 kg / ağaç

***Tavsiye edilen gübreleme dozları söz konusu bitkilerin taban gübrelemesi için verilen aralıktır. En doğru gübreleme dozları için gerekli analizlerin mutlaka yapılması tavsiye edilir.